

Levetiracetam for Treatment of Non-psychotic and Non-depressive behavioural symptoms of dementia.

Gepubliceerd: 08-08-2006 Laatste bijgewerkt: 18-08-2022

Specific behavioural symptoms of dementia need specific treatment. In cases, Levetiracetam seems to be effective in Non-psychotic and Non-depressive behavioural symptoms of dementia.

Ethische beoordeling	Positief advies
Status	Werving gestopt
Type aandoening	-
Onderzoekstype	Interventie onderzoek

Samenvatting

ID

NL-OMON23657

Bron

Nationaal Trial Register

Verkorte titel

LaTiNN

Aandoening

3 months, prospective, open label trial

Ondersteuning

Primaire sponsor: Dep geriatrics JBZ

Hervensebaan 4

Postbus 1101 5200 BD Den Bosch

073-6998629

Overige ondersteuning: UCB for support for statistical analysis if needed, however Dep geriatrics Utrecht University (Rob van Marum) will first perform this analysis

Maximum of € 10.000

Onderzoeksproduct en/of interventie

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Effect on week 4 and 13 compared to base-line on Behavioral symptoms (NPI and CMAI), care-giver burden (CBI) and clinical impression (GCI).

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

N/A

Doel van het onderzoek

Specific behavioural symptoms of dementia needs specific treatment. In cases, Levetiracetam seems to be effective in Non-psychotic and Non-depressive behavioural symptoms of dementia.

Onderzoeksopzet

N/A

Onderzoeksproduct en/of interventie

500 mg Levetiracetam/day, maximum 1500 mg Levetiracetam/day.

Contactpersonen

Publiek

Jeroen Bosch Hospital, Department Geriatrics,
P.O. Box 90153

P.L.J. Dautzenberg
Den Bosch 5200 ME
The Netherlands

+31 (0)73 6998629

Wetenschappelijk

Jeroen Bosch Hospital, Department Geriatrics,
P.O. Box 90153

P.L.J. Dautzenberg
Den Bosch 5200 ME
The Netherlands
+31 (0)73 6998629

Deelname eisen

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

1. Ambulant patients with dementia, level Reisberg 4-6;
2. Informant available.;
3. 6 weeks stable treatment of dementia; anti-psychotics and anti-depressants.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

1. NPI item hallucinations, delusions and depression > ;1
2. Epilepsia;
3. Alcoholism;
4. DM or thyroid disease not under control.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Interventie onderzoek

Onderzoeksmodel:	Anders
Toewijzing:	N.v.t. / één studie arm
Blinding:	Open / niet geblindeerd
Controle:	N.v.t. / onbekend

Deelname

Nederland	
Status:	Werving gestopt
(Verwachte) startdatum:	01-08-2006
Aantal proefpersonen:	25
Type:	Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Positief advies	
Datum:	08-08-2006
Soort:	Eerste indiening

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register	ID
NTR-new	NL776
NTR-old	NTR787
Ander register	: N/A
ISRCTN	ISRCTN97133543

Resultaten

Samenvatting resultaten

Dautzenberg PLJ et al. Medicamenteuze behandelning van gedrags- en psychische problemen bij dementie (BPSD). Tijdschrift voor verpleeghuisgeneeskunde 2003;27(5):5-9.

Weiner MF et al. Levetiracetam for agitated Alzheimer's disease patients. Int J Psychogeriatrics 2005;17(2):327-8.