

Crossvalidering van de MMPI-2 RC-schalen in een Nederlandse psychiatrische steekproef.

Gepubliceerd: 18-04-2007 Laatste bijgewerkt: 08-05-2024

Onderzoek naar de validiteit van een set nieuwe schalen in de MMPI-2 met behulp van een semi-gestructureerd interview dat in de wetenschappelijke literatuur ook wel gezien wordt als 'de gouden standaard'.

Ethische beoordeling	Goedgekeurd WMO
Status	Werving gestart
Type aandoening	Psychiatrische stoornissen NEG
Onderzoekstype	Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Samenvatting

ID

NL-OMON31255

Bron

ToetsingOnline

Verkorte titel

Validering van de MMPI-2 RC-schalen in een psychiatrische steekproef.

Aandoening

- Psychiatrische stoornissen NEG

Synoniemen aandoening

psychiatrische stoornissen, psychopathologie

Betreft onderzoek met

Mensen

Ondersteuning

Primaire sponsor: GGZ Den Bosch (Den Bosch)

Overige ondersteuning: Ministerie van OC&W

Onderzoeksproduct en/of interventie

Trefwoord: DSM-IV, MMPI-2, persoonlijkheidsdiagnostiek, psychiatrische steekproef, RC-schalen

Uitkomstmaten

Primaire uitkomstmaten

Correlaties tussen de MMPI-2 RC schalen en DSM-IV diagnoses, voorspelling van SCID diagnoses met behulp van MMPI-2 scores.

Secundaire uitkomstmaten

N.v.t.

Toelichting onderzoek

Achtergrond van het onderzoek

De Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2; Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen, & Kaemmer, 1989) is wereldwijd de meest gebruikte en onderzochte psychologische test om psycho-pathologie en persoonlijkheidskenmerken in kaart te brengen (Friedman et al., 2001; Butcher, 2005; Butcher, Graham, Ben-Porath, Tellegen, Dahlstrom & Kaemmer, 2001; Butcher & Rouse, 1996; Ca-mara, Nathan, & Puente, 2000). De MMPI-2 is een revisie van de MMPI (Hathaway & McKinley, 1943) die eind jaren dertig in de Verenigde Staten werd ontwikkeld voor het diagnosticeren van veel-voorkomende psychiatrische stoornissen. Sinds de publicatie van de MMPI zijn er meer dan 15.000 publicaties verschenen over de Amerikaanse versie en de diverse internationale bewerkingen. De MMPI-2 wordt in ongeveer 60 landen gebruikt (Butcher, 1996), waaronder Nederland.

Hoewel de MMPI-2 wereldwijd het meest onderzochte en gebruikte instrument is binnen de klinische psychologie (Butcher & Rouse, 1996) kent de test enkele beperkingen. Een van de problemen is de hoge intercorrelatie van de klinische schalen (Tellegen, Ben-Porath, McNulty, Arbisi, Graham, J.R., & Kaemmer, 2003). Een voorbeeld hiervan is de correlatie van meer dan .80 tussen Schaal 7 (Psychastenie; Pt), welk een maat beoogd te zijn voor neuroticisme en Schaal 8 (Schizofrenie; Sc) welke een indicatie voor psychoticisme is (Butcher et al., 1989, Tellegen et al., 2003, voor de Nederlandse versie zie Derksen et al., 1993).

In 2003 werden de MMPI-2 Restructured Clinical-scales (RC-scales; Tellegen et al., 2003) ontwikkeld om beperkingen van de klinische schalen op een

efficiënte en directe wijze te kunnen hanteren. Doel was het beschrijvende vermogen van de klinische schalen te behouden en tegelijkertijd het dis-criminerend en voorspellend vermogen te vergroten (Tellegen et al., 2003). De *algemene psychopathologie factor* én de overlappende items die verantwoordelijk zijn voor de hoge intercorrelaties werden uit de klinische schalen verwijderd zodat alleen de kern over zou blijven. De RC-schalen werden geconstrueerd met behulp van bestaande items uit de MMPI-2 zodat men aansluiting kan houden met de enorme hoeveelheid wetenschappelijke literatuur die er voorhanden is. Watson en Tellegen's hiërarchische theorie of mood and affect vormde de leidraad bij de ontwikkeling van de RC-schalen, waarmee tevens voorzien werd in een theoretisch kader.

Het huidige onderzoek betreft een valideringsstudie van de Nederlandse RC-schalen in relatie tot de SCID, een semi-gestructureerd interview voor het vaststellen van DSM-IV classificaties. Daartoe zullen bij 100 poliklinische psychiatrische patiënten zowel een SCID als een MMPI-2 worden afgenomen. Verwacht wordt dat de nieuwe RC-schalen betere correlaties zullen laten zien met de DSM-IV classificaties dan de traditionele klinische schalen.

Doel van het onderzoek

Onderzoek naar de validiteit van een set nieuwe schalen in de MMPI-2 met behulp van een semi-gestructureerd interview dat in de wetenschappelijke literatuur ook wel gezien wordt als 'de gouden standaard'.

Onderzoekopzet

Bij 100 proefpersonen zal zowel een SCID als een MMPI-2 worden afgenomen. Alle cliënten die worden aangemeld voor persoonlijkheidsonderzoek bij het team psychodiagnostiek zullen worden benaderd voor deelname aan het onderzoek. De ruwe MMPI-2 en SCID scores zullen worden gebruikt in de analyses. Op basis van deze scores worden validiteitscoëfficiënten van de MMPI-2 RC-schalen berekend.

Inschatting van belasting en risico

Het psychologisch onderzoek zal in de meeste gevallen extra tijd vergen van cliënten (oplopend tot ongeveer 2 uur extra tijd). De SCID wordt namelijk toegevoegd aan het standaardprotocol voor persoonlijkheidsonderzoek (de MMPI-2 maakt al onderdeel uit van de standaard testbatterij). We hebben afgesproken dat de VKP (maakt deel uit van standaard batterij en vertoont veel overlap met SCID-II) uit de testbatterij wordt geschrapt. Hierdoor kan de extra tijdsinvestering worden beperkt. Het onderzoek brengt geen risico's met zich mee voor de deelnemers.

Contactpersonen

Publiek

GGZ Den Bosch (Den Bosch)

Postbus 70058
5201 DZ 's-Hertogenbosch
Nederland

Wetenschappelijk

GGZ Den Bosch (Den Bosch)

Postbus 70058
5201 DZ 's-Hertogenbosch
Nederland

Locaties

Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd

Netherlands

Deelname eisen

Leeftijd

Volwassenen (18-64 jaar)
65 jaar en ouder

Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen (Inclusiecriteria)

Leeftijd 18-65 jaar, IQ >90, verwijzing voor standaard persoonlijkheidsdiagnostiek.

Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

IQ < 90, slechte beheersing van Nederlandse taal.

Onderzoeksopzet

Opzet

Type: Observationeel onderzoek, zonder invasieve metingen

Blinding: Open / niet geblindeerd

Controle: Geen controle groep

Doel: Diagnostiek

Deelname

Nederland

Status: Werving gestart

(Verwachte) startdatum: 01-05-2007

Aantal proefpersonen: 100

Type: Werkelijke startdatum

Ethische beoordeling

Goedgekeurd WMO

Datum: 18-04-2007

Soort: Eerste indiening

Toetsingscommissie: METIGG: Medisch Ethische Toetsingscommissie Instellingen Geestelijke Gezondheidszorg (Utrecht)

Registraties

Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

In overige registers

Register

CCMO

ID

NL16709.097.07