

# Morfine versus piritramide (Dipidolor®) voor post-operatieve pijnbestrijding

## Snelheid van effect en incidentie van misselijkheid en braken na intraveneuze toediening

### Een vergelijkende studie

Gepubliceerd: 25-06-2007 Laatste bijgewerkt: 30-11-2024

Nagaan of er verschillen zijn tussen morfine en piritramide wat betreft het optreden van misselijkheid en braken en de tijdsduur tot het intreden van adequate analgesie.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| <b>Ethische beoordeling</b> | Goedgekeurd WMO       |
| <b>Status</b>               | Beëindigd             |
| <b>Type aandoening</b>      | Overige aandoening    |
| <b>Onderzoekstype</b>       | Interventie onderzoek |

## Samenvatting

### ID

NL-OMON31311

### Bron

ToetsingOnline

### Verkorte titel

Postoperatieve misselijkheid, morfine versus piritramide

### Aandoening

- Overige aandoening

### Synoniemen aandoening

misselijkheid, pijnstilling

### Aandoening

pijn en misselijkheid

**Betreft onderzoek met**  
Mensen

## Ondersteuning

**Primaire sponsor:** Atrium Medisch Centrum

**Overige ondersteuning:** het ziekenhuis (apothek) verleent kosteloos medewerking

## Onderzoeksproduct en/of interventie

**Trefwoord:** misselijkheid en braken, morfine, piritramide, postoperatieve analgesie

## Uitkomstmaten

### Primaire uitkomstmaten

De incidentie van misselijkheid en braken.

### Secundaire uitkomstmaten

De tijdsduur tot adequate analgesie intreedt.

## Toelichting onderzoek

### Achtergrond van het onderzoek

Misselijkheid en braken zijn frequent voorkomende bijwerkingen van van opiaten, toegediend voor pijnbestrijding postoperatief. De indruk bestaat dat deze complicatie vaker optreedt met morfine; tevens dat het intreden van analgesie langer duurt met morfine in vergelijking tot piritramide, dat in het verleden werd gebruikt.

### Doel van het onderzoek

Nagaan of er verschillen zijn tussen morfine en piritramide wat betreft het optreden van misselijkheid en braken en de tijdsduur tot het intreden van adequate analgesie.

### Onderzoeksopzet

Dubbelblind

### Onderzoeksproduct en/of interventie

Intraveneuze toediening van morfine of piritramide

### **Inschatting van belasting en risico**

Geen

## **Contactpersonen**

### **Publiek**

Atrium Medisch Centrum

Postbus 4446  
6401 CX Heerlen  
NL

### **Wetenschappelijk**

Atrium Medisch Centrum

Postbus 4446  
6401 CX Heerlen  
NL

## **Locaties**

### **Landen waar het onderzoek wordt uitgevoerd**

Netherlands

## **Deelname eisen**

### **Leeftijd**

Volwassenen (18-64 jaar)  
65 jaar en ouder

### **Belangrijkste voorwaarden om deel te mogen nemen**

## (Inclusiecriteria)

volwassen patiënten die een electieve chirurgische ingreep onder algehele anesthesie ondergaan

## Belangrijkste redenen om niet deel te kunnen nemen (Exclusiecriteria)

Jonger dan 18 jaar. De toepassing van regionale pijnbestrijdingstechnieken

## Onderzoeksopzet

### Opzet

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Fase onderzoek:  | 4                      |
| Type:            | Interventie onderzoek  |
| Onderzoeksmodel: | Parallel               |
| Toewijzing:      | Gerandomiseerd         |
| Blindering:      | Dubbelblind            |
| Controle:        | Actieve controle groep |
| Doel:            | Behandeling / therapie |

### Deelname

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Nederland               |                       |
| Status:                 | Beëindigd             |
| (Verwachte) startdatum: | 13-09-2007            |
| Aantal proefpersonen:   | 278                   |
| Type:                   | Werkelijke startdatum |

### In onderzoek gebruikte producten en hulpmiddelen

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Soort:          | Geneesmiddel                                           |
| Merknaam:       | Dipidolor                                              |
| Generieke naam: | piritramide                                            |
| Registratie:    | Geregistreerd voor de te bestuderen indicatie/dosering |

|                 |                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Soort:          | Geneesmiddel                                           |
| Merknaam:       | morphine                                               |
| Generieke naam: | morfine                                                |
| Registratie:    | Geregistreerd voor de te bestuderen indicatie/dosering |

## Ethische beoordeling

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Goedgekeurd WMO     |                                   |
| Datum:              | 25-06-2007                        |
| Soort:              | Eerste indiening                  |
| Toetsingscommissie: | METC Z: Zuyderland-Zuyd (Heerlen) |

## Registraties

### Opgevolgd door onderstaande (mogelijk meer actuele) registratie

Geen registraties gevonden.

### Andere (mogelijk minder actuele) registraties in dit register

Geen registraties gevonden.

### In overige registers

| Register | ID                     |
|----------|------------------------|
| EudraCT  | EUCTR2007-000659-32-NL |
| CCMO     | NL16524.096.07         |